



GRISU®



Përbërja	Iprodione 40.96 % (500 g/L)
Formulimi	Suspension i koncentruar (SC)
Grupimi	FRAC 2
N. regjistrimit	506. më 8/01/2013
Konfeksioni	10ml-50ml-100ml-1lit

Fungicid me veprim kontakti dhe spektër të gjerë përdorimi



KARAKTERISTIKAT

GRISU është fungicid me përmbajtje Iprodione, lëndë aktive e familjes së dikarbo-simideve. Karakterizohet nga një aktivitet nëpërmjet kontaktit, dhe rezulton aktiv tek Botrytis spp., Sclerotinia spp., Alternaria spp., Stemphylium spp. dhe Monilia spp., si edhe për agentët e kalbëzimit sekundar. Fungicid me spektër të gjerë veprimi.

KULTURAT	SËMUNDJA	MËNYRA PËRDORIMIT	KARENCA
VRESHTË	Kalbëzimi gri i rrushit (<i>Botrytis cinerea</i>)	Bëhet ndërhyrja paraprake në fazën e infektimit më të madh të veshulit nga patogjeni (pas-lulëzimi deri në pjekje me dozë 150 ml/hl (1.5 lit/ha).	28 ditë
DARDHË	Kundër Njolllosjes kafe (<i>Stemphylium spp.</i>)	Trajtoni nga fundi i lulëzimit dhe më pas, me ritëm në interval 8-10 ditë me dozë 150 ml/hl (2.25 lit/ha).	21 ditë
PJESHKË NEKTARINË	Kalbëzimi i frutave (<i>Monilia spp.</i>)	a) në mbrojtje të lulëzimit, pas para-lulëzimit dhe fillimit të rënies petaleve; b) mbi frutat e zhvilluar, perceptuesndaj patogjenit me dozë 150 ml/hl (2.25 lit/ha).	3 ditë
LULESHTRYDHE	Kalbëzimi gri (<i>Botrytis cinerea</i>)	Bëhet ndërhyrje në fillim të lulëzimit, me interval 7-10 ditë në serra dhe 10-14 ditë në fushë të hapur me dozë 1.5-2 lit/ha	21 ditë
DOMATE	Kalbëzimi gri (<i>Botrytis cinerea</i>), Kalbëzimi i bardhë (<i>Alternaria spp.</i>)	Në sera, 150-200 ml/hl (1.5-2 lit/ha). Bëhet ndërhyrje parandaluese në funksion të kushteve klimatike, me interval 7-10 ditë.	14 ditë në serë
SALLATË DHE TË NGJASHME	Kalbëzimi gri (<i>Botrytis cinerea</i>), Kalbëzimi i bardhë (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	Bëhet ndërhyrje herët, me trajtime parandaluese, duke filluar pas-trapianti ose nga 2-3 gjethet e vërteta mbi kulturat e mbjella me dozë 150-200 ml/hl (1.5 lit/ha).	14 ditë në serë 21 ditë në fushë
KOLZË	Alternaria e Sclerotinia (<i>Alternaria spp.</i>), (<i>Sclerotinia spp.</i>)	Bëhet ndërhyrja në fazat e para të zhvillimit të patogjenit me dozë 1-1.5 lit/ha.	48 ditë

GRISU®

FUNGICID KONTAKTI KUNDËR KALBËZIMEVE

- Shumë selektiv
- Lufton kalbëzimet
- Me spektër të gjerë veprimi

